

sation. [N.d.l.r. : certains experts proposent aussi l'utilisation de clindamycine en cas d'allergie aux pénicillines].

Des mesures visant à prévenir la propagation de l'infection, telles l'éviction de l'école ou de la crèche, le lavage des mains, des ongles et des vêtements sont certainement à recommander.

## Principales références

Anonyme. L'impétigo en bref. *La Revue Prescrire* 2000; 20: 564-65

Anonyme. Interventions for impetigo (Cochrane Review). *The Cochrane Library*. Issue 3, 2004.

Sladden M, Johnston GA. Common skin infections in children. *BMJ* 2004; 329: 95-99

## Noms de spécialités

Acide fusidique: Fucidin®

Cloxacilline: Penstaphon®

Flucloxacilline: Floxapen®, Staphycid®

Mupirocine: Bactroban®

---

## INFORMATIONS RECENTES DECEMBRE 2004 – JANVIER 2005

Pour la période de décembre 2004 à janvier 2005, les nouvelles spécialités suivantes nous paraissent intéressantes à signaler.

- La **solifénacine (Vesicare®)** est un nouvel antispasmodique urinaire à propriétés anticholinergiques utilisé dans l'instabilité vésicale.
- La **prégabaline (Lyrica®)** est un nouvel antiépileptique apparenté à la gabapentine. Elle est indiquée chez l'adulte dans le traitement en association de l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire, ainsi que dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques. Son efficacité et ses effets indésirables semblent comparables à ceux de la gabapentine.
- Le **fosamprénavir (Telzir®)**, une prodrogue de l'amprénavir, est indiqué pour le traitement en association des infections à VIH.
- La **témoporfine (Foscan®)** est un agent photosensibilisant utilisé pour le traitement de certains carcinomes épidermoïdes avancés de la tête et du cou.