

dose un peu plus élevée que celle mentionnée antérieurement dans les Folia], mais en association à une benzodiazépine à durée d'action d'intermédiaire afin de limiter le plus possible la dose et les effets indésirables de l'antipsychotique. Lorsque le traitement par voie orale n'est pas possible ou pas suffisamment efficace, il peut être nécessaire de recourir à l'administration par voie intramusculaire.

- Pour le traitement des troubles du comportement chez les patients déments, les antipsychotiques atypiques rispéridone et olanzapine ne sont pas recommandés, selon NICE, en raison du risque accru d'accidents vasculaires cérébraux et de la mortalité accrue. Par ailleurs, les résultats d'une méta-analyse récente d'études contrôlées (durée de traitement de 10 semaines en moyenne) indiquent une mortalité accrue chez les patients déments avec n'importe quel antipsychotique atypique (aripiprazole, olanzapine, quétiapine, rispéridone), et la *Food and Drug Administration* américaine a émis un avertissement à ce sujet [via www.fda.gov/cder/drug/advisory/antipsychotics.htm]. En fait, un tel risque ne peut être exclu avec aucun antipsychotique (atypique ou classique).

Récemment, le *New England Journal of Medicine* [2006; 355: 1525-38] a publié les résultats d'une étude randomisée sur l'efficacité des antipsychotiques atypiques dans le traitement de l'agitation et de la confusion chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les résultats montrent qu'un traitement ambulatoire prolongé (36 semaines) par un antipsychotique atypique tel l'olanzapine, la quétiapine ou la rispéridone n'est pas plus efficace qu'un placebo, et est associé à un taux plus élevé d'abandons en raison d'effets indésirables. Ces résultats confirment que les antipsychotiques ne sont pas indiqués dans les troubles du comportement chez les patients déments, et la durée de traitement doit en tout cas être la plus courte possible.

Noms de spécialités

Aripiprazole: Abilify®

Halopéridol: Haldol®

Lorazépam: Doclaraze®, Lauracalm®,

Lorazemed®, Lorazetop®, Lorazepam EG®,

Lorazepam Teva®, Loridem®,

Optisedine®, Serenase®, Temesta®

Olanzapine: Zyprexa®

Quétiapine: Seroquel®

Rispéridone: Risperdal®

En bref

- Depuis début 2005, les médecins, pharmaciens et dentistes peuvent s'inscrire à **Folia Express** pour être informés par e-mail chaque fois qu'un nouveau communiqué paraît sur notre site web dans la rubrique "Bon à savoir", ainsi que de la mise à jour mensuelle du Répertoire et de la parution d'un nouveau numéro des Folia sur le site web.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'adresse e-mail folia@ugent.be en men-

tionnant "Folia Express", nom, adresse e-mail, adresse postale et profession.

Attention: nous avons remarqué que lors de l'envoi d'un Folia Express, plusieurs messages nous reviennent, probablement parce que l'adresse e-mail n'est plus valable ou a été changée. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir spontanément des changements d'adresse e-mail.