

org et le tableau CYP dans l'Introduction du Répertoire]. Il est intéressant pour le voyageur infecté par le VIH de savoir quels médicaments ne présentent pas d'interactions; ainsi, des antibactériens recommandés en cas de diarrhée du voyageur (ciprofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, azithromycine: voir Folia de mai 2007), des médicaments proposés dans la prévention de la malaria [voir Folia de mai 2007] ainsi que des médicaments tels que le paracétamol, l'acide acétylsalicylique, l'ibuprofène, le lopéramide et la cétirizine peuvent être pris sans danger. Il n'y a pas non plus d'interactions connues entre les antirétroviraux et le produit répulsif à base de DEET.

Infections sexuellement transmissibles

Lors d'un voyage, la possibilité de contact sexuel accidentel est plus grande. Des infections sexuellement transmissibles¹ (IST)

¹ Infections sexuellement transmissibles (IST) est une traduction de l'anglais Sexually Transmitted Infections (STI). Beaucoup d'infections n'entraînent pas systématiquement une maladie. C'est pour cette raison qu'infections sexuellement transmissibles (IST) est actuellement préférable à maladies sexuellement transmissibles (MST).

peuvent dès lors constituer un problème important chez les voyageurs, et il y a lieu d'en discuter avec le voyageur avant le départ.

- En cas de contact sexuel génital ou oral avec un partenaire non fixe et non exclusif, l'utilisation d'un condom est impérative. Les condoms seront de préférence achetés avant le voyage, étant donné la meilleure garantie de qualité. Lorsque le condom est utilisé en même temps qu'un lubrifiant hydrosoluble, le risque de déchirure du condom est beaucoup plus faible.
- La vaccination contre l'hépatite B est fortement recommandée en cas de possibilité de contacts sexuels à risque.
- Chez les personnes infectées par le VIH, contracter une IST risque de causer une augmentation de la « charge virale ». De plus, une surinfection par un autre sous-type de VIH peut survenir, avec échec possible du traitement antirétroviral pris par le patient à ce moment-là. Une IST augmente aussi la contagiosité des patients infectés par le VIH.

Bon à savoir

VERSION WINDOWS MOBILE POUR PDA DU REPERTOIRE COMMENTE DES MEDICAMENTS

Le CBIP met à disposition depuis fin mars une version Windows Mobile pour PDA (WM-PDA) du Répertoire Commenté des Médicaments. Vous trouverez une information plus détaillée dans le communiqué du 21/3/08 dans la rubrique « Bon à savoir » sur notre site Web. Un mode d'emploi succinct ainsi qu'une aide à l'installation sont également mis à votre disposition.

« L'ancienne » version HTML pour PDA, dont les possibilités et le contenu sont plus limités, mais qui contient du code HTML pur et peut donc être utilisée sur davantage d'appareils, reste disponible pour le moment.

Vous pouvez adresser vos questions ou vos remarques au pharm. Isabelle Latour (informatique@cbip.be).