

pendant 12 mois d'une thiényopyridine (clopidogrel, prasugrel, ticlopidine) ou de ticagrélor. Chez les patients atteints d'angor mais sans syndrome coronarien aigu, l'association de clopidogrel à 75 mg à l'acide acétylsalicylique constitue le premier choix après la pose d'un stent, en raison du risque plus faible de thrombose de stent, d'infarctus ou d'AVC. Le prasugrel et le ticagrélor sont plus efficaces que le clopidogrel en cas de syndrome coronarien aigu, mais sont associés à un plus grand risque d'hémorragies.

- Des études menées chez des patients porteurs d'un stent et prenant déjà des antago-

nistes de la vitamine K (p.ex. en raison d'une fibrillation auriculaire), révèlent un risque nettement accru d'hémorragies avec une trithérapie (ajout d'acide acétylsalicylique et d'une thiényopyridine à l'antagoniste de la vitamine K) par rapport à une double thérapie par une thiényopyridine + un antagoniste de la vitamine K, mais sans bénéfice en termes de complications thromboemboliques³⁴.

Note

La liste des références et une version plus détaillée de cette mise à jour sont disponibles sur www.cbip.be

Bon à savoir

CHANGEMENTS DANS L'OFFRE DES VACCINS MIS GRATUITEMENT À DISPOSITION PAR LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE DANS LE CADRE DES VACCINATIONS DE BASE

Les vaccins administrés aux enfants et aux jeunes dans le cadre de leurs vaccinations de base sont fournis gratuitement par les Communautés, à l'exception du vaccin contre le rotavirus (voir tableau 12a dans le Répertoire). A partir du 1^{er} juillet 2014, quelques changements seront apportés dans l'offre des vaccins mis gratuitement à disposition par la Communauté flamande¹.

- Infanrix Hexa® sera remplacé par Hexyon®.
- Gardasil® (vaccin HPV avec des protéines des sérotypes HPV 6, 11, 16 et 18) sera remplacé par Cervarix® (vaccin HPV avec des protéines des sérotypes HPV 16 et 18). Au lieu de 3 doses, deux doses du vaccin contre le HPV seront administrées (avec un intervalle de 6 mois entre les 2 doses). La vaccination reste gratuite pour les jeunes filles en première année secondaire.
- Tedivax pro adulto® qui est administré chez l'adulte tous les 10 ans pour la vac-

cination de rappel contre le tétanos et la diphtérie, sera remplacé par Boostrix®. Boostrix® contient, en plus de l'anatoxine tétanique et diphtérique, des antigènes du *Bordetella pertussis*. De plus, Boostrix® est également proposé gratuitement pour la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte; la vaccination est recommandée entre la 24^{ème} et la 32^{ème} semaine de grossesse, et ceci à chaque grossesse.

Pour plus de détails, nous renvoyons au communiqué du Bon à savoir en néerlandais du 10/05/14. En Wallonie, aucun changement n'est prévu à court terme en ce qui concerne l'offre de vaccins par la Communauté française. Pour Bruxelles, la question de savoir si ces vaccins peuvent également être obtenus gratuitement ou non, doit encore être discutée avec la Commission communautaire commune.

1 Website Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Gratis-vaccinatie-tegen-kinkhoest-voor-zwangeren-en-anderen-volwassenen-vanaf-1-juli/