sévère (clairance < 30 ml/min). Vu l'expérience limitée, il est actuellement difficile d'évaluer le bénéfice clinique de l'idaruzumab. Il s'agit d'un médicament réservé à l'usage hospitalier.³

3 La Revue Prescrire 2016;36:259 ; Pharma Selecta 2016;32:18-20.

En bref

- Le Conseil Supérieur de la Santé a publié une **révision des recommandations nutritionnelles pour les vitamines et les oligo-éléments** sur base des dernières connaissances scientifiques disponibles; ces recommandations seront complétées ultérieurement par la révision des données concernant les autres nutriments (macronutriments, protéines, lipides, glucides et eau). Les apports journaliers recommandés (AJR) pour les vitamines ont notamment été réévalués, et certains d'entre eux ont été adaptés conformément aux recommandations de l'*European Food Safety Authority* (EFSA), entre autres pour les vitamines A, B₅, B₆, B₁₂, l'acide folique et la vitamine

- La forme orale de la spécialité **Rydene®** à base de nicardipine a été retirée du marché; la **nicardipine** n'est plus disponible que sous forme injectable (chapitre 1.6.1.).

E. Les données dans le chapitre 14.2. du Répertoire ont été adaptées dans ce sens. Cette révision des recommandations nutritionnelles est l'occasion de rappeler que l'utilisation d'un complément alimentaire vise à compléter la ration alimentaire lorsque celle-ci s'avère insuffisante; des apports complémentaires proches des AJR sont donc généralement suffisants. L'utilisation de compléments alimentaires dépassant largement les AJR ne se justifie pas et peut parfois entraîner des effets indésirables (p.ex. risque de lithiase rénale avec la vitamine C). Plus d'informations sur www.css-hgr.be, terme de recherche: avis 9164 & 9174.

Communiqué par le Centre de Pharmacovigilance

LE SYNDROME SÉROTONINERGIQUE

Une *Direct Healthcare Professional Communication* (DHPC)¹ a attiré récemment l'attention sur le risque de syndrome sérotoninergique en cas d'association de l'analgésique morphinique fentanyl à des médicaments sérotoninergiques². Cette DHPC est l'occasion de remettre en lumière un certain nombre de points concernant le syndrome

sérotoninergique; nous sommes basés principalement sur le *Stockley's Drug Interactions*³ et sur un article de synthèse publié dans *The BMJ* en 2014⁴.

- Les cas graves de syndrome sérotoninergique s'observent habituellement en cas de prise de deux ou plusieurs médicaments sérotoninergiques (également à

1 Il s'agit d'un courrier d'une firme pharmaceutique à l'attention des professionnels de la santé, voir Folia de mars 2011.

2 www.afmps.be > Usage humain > Pharmacovigilance > Lettres aux professionnels > Durogesic (document du 26/10/2015)

3 Version électronique consultée pour la dernière fois le 01/04/16

4 *BMJ* 2014;348: g1626 (doi:10.1136/bmj.g1626)