

Vous prenez une gliflozine contre le diabète : que devez-vous savoir ?

Les médicaments concernés sont :
Invokana® (canagliflozine), Forxiga®
(dapagliflozine) et Jardiance®
(empagliflozine).

Comment ces médicaments fonctionnent-ils ?

Ces médicaments entraînent une augmentation des pertes de sucre dans les urines. Et c'est le but : ainsi ils font baisser le taux de sucre dans le sang.

Ces médicaments sont généralement bien tolérés.

Mais ils peuvent entraîner des effets indésirables :

- Des **infections de la vessie ou de la région génitale** plus fréquentes. Elles peuvent se produire tant chez l'homme que chez la femme. Dans de rares cas, ces infections peuvent être très graves.
- Une **miction plus fréquente et une déshydratation plus rapide**. Vous le remarquez parce que vous avez plus soif, vous avez des vertiges et, dans les cas extrêmes, vous vous évanouissez.
- Davantage de **problèmes de pieds**, tels que des plaies et des ulcères. Il est donc particulièrement important de bien soigner vos pieds.
- Un effet indésirable rare, mais très dangereux est l'**acidocétose** ou l'**acidification du sang**. Cela peut se produire lorsque vous êtes malade, avec de la fièvre et des vomissements, lorsque vous mangez très peu pendant une longue période ou lorsque vous subissez une intervention chirurgicale importante.



Contactez donc votre médecin si :

- vous souffrez de **démangeaisons ou d'écoulements génitaux ou de douleurs à la miction**.
- vous souffrez de **vertiges**, vous sentez **faible** ou pensez que vous allez vous évanouir.
- vous avez une plaie ou un ulcère aux **pieds**.
- vous avez de la **fièvre**, des **vomissements**, de la **diarrhée** ou vous ne pouvez pas manger pendant plus de 24 heures.
- vous devez subir une **intervention chirurgicale**.

Votre médecin pourra déterminer si un traitement supplémentaire est nécessaire, ou si votre traitement doit être ajusté ou arrêté (temporairement).

Contactez d'urgence votre médecin (ou le médecin de garde) si :



- vous avez de fortes **douleurs abdominales** ou des **vomissements**, ou si **vous vous sentez somnolent-e et faible**. Cela peut être un signe d'acidocétose (acidification du sang).
- vous ressentez de fortes **douleurs** ou vous remarquez un **gonflement ou une rougeur dans la région génitale**, surtout si vous avez de la **fièvre**.